

## SCANNER CON MEDIO DE CONTRASTE

El **scanner** es un examen que utiliza un haz de rayos X para la formación de imágenes, el cual se focaliza en el área a estudiar. Es un examen sencillo, rápido, seguro y no invasivo.

Algunas veces, dependiendo del área o patología a estudiar es necesario inyectar medio de contraste endovenoso, el cual permite aumentar la sensibilidad del estudio. Para ello el tecnólogo médico le instalará una vía venosa al momento del examen.

### INDICACIONES PREVIAS

Este examen **requiere preparación previa**. El día de su cita usted debe:

- En caso de que la solicitud de examen indique scanner de abdomen, angiografía de abdomen, angiografía renal u otro que implique evaluación del abdomen (estudio de hígado, páncreas, riñones, entre otros) se requiere de ayuno de 4 horas. Si su orden no indica ninguno de los antes mencionados, no se requiere ayuno.
- En caso de tener antecedente de haber presentado reacción alérgica al medio de contraste o tiene antecedentes de alergias que requieran tratamiento, será necesario evaluar premedicación. En este caso será necesario tome contacto con la unidad, para la entrega o envío de orden de premedicación.
- En caso de ser paciente asmático debe acudir a la toma de examen con su inhalador.
- Presentar un **examen de creatinina de no mayor a 15 días de antigüedad**, en caso de tener alguna condición de riesgo de nefropatía. Ello aplica en paciente:
  - $\geq 60$  años
  - Diabético
  - Que tenga enfermedad renal conocida.
  - Que se haya realizado cirugía renal.
  - Monorreno.
  - Hipertenso.
  - Con mieloma múltiple.
  - Paciente que tome metformina.
  - Paciente que tome fármacos nefrotóxicos (antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos, inmunosupresores). Nota: en ellos no se recomienda suspender fármacos.
  - Le están solicitando de examen un UROTAC

- Si cuenta con estudios previos relacionados con el examen debe presentarlos el día su citación.
- Si paciente es mujer y **sospecha estar embarazada**, debe postergar el estudio, salvo indicación explícita del médico tratante.

Además, debe considerar lo siguiente:

- Asistir 15 minutos antes de su cita, para realizar trámite administrativo.
- Presentar su orden médica y cedula de identidad al momento de su atención en la recepción.

### INDICACIONES POST EXAMEN

- Al finalizar el estudio, usted podrá continuar con sus actividades habituales, régimen alimenticio normal.
- Se recomienda beber abundante líquido en las siguientes 48 horas (salvo que exista una contraindicación médica), con el objetivo de eliminar rápidamente el medio de contraste.
- En caso de aparición de una reacción de hipersensibilidad tardía como prurito, exantema maculopapular o urticaria, debe acudir al servicio de urgencia más cercano e indicar que pudiese estar cursando una reacción a la inyección del medio de contraste. La reacción tardía puede aparecer entre 1 hora y 1 semana tras la administración de contraste, son poco frecuentes.
- Si toma metformina debe seguir la indicación post examen que le dio el profesional responsable del estudio de acuerdo con la función renal calculada al momento del examen.  
Cualquier otro medicamento puede tomarlo de forma habitual.
- Si se encuentra en periodo de lactancia, puede continuar normalmente con ella. Si aún con esta indicación, le preocupa existan posibles efectos nocivos para el bebé puede abstenerse de amamantar desde el momento de la administración del contraste por un período de 12 a 24 horas. No tiene ningún valor dejar de amamantar más allá de las 24 horas.
- El **resultado** del examen se entrega en formato digital a través de nuestra página web [www.clinicapv.cl](http://www.clinicapv.cl). Para ello nuestros funcionarios le entregaran un instructivo, con un código web al momento de su atención.